（中国乙06）
麻疹（はしか）発生推移

発表：2018年09月14日衛生健康委

作成：2018年09月14日

日中医療衛生情報研究所

麻疹（はしか）

- 中国の麻疹は、2012年を底に2014年のピーク期を経て減少傾向にある。
- 2010年を除き、毎年4月～5月に発生がピークとなるが、2016年5月は減少を示した。
- 数年毎に突如増えて減少するというパターンを繰り返しているのか、過去に遡ってみようと検討中。

（問題はどこまで遡れるか、、）

乙06：はしか


中国の麻疹（はしか）発症者数（月別）
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
15,000
13,500
12,000
10,500
9,000
7,500
6,000
4,500
3,000
1,500
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月


中国の麻疹（はしか）死亡者数（月別）
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
14
12
10
8
6
4
2
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

乙06：はしか


中国の麻疹（はしか）発症者数（年別）
135,000
120,000
105,000
90,000
75,000
60,000
45,000
30,000
15,000
0
131,441
52,461
38,159
9,943
6,183
27,646
52,628
42,361
24,820
5,941
3,735
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年(8月)


中国の麻疹（はしか）死亡者数（年別）
120
100
80
60
40
20
0
102
39
27
10
8
24
28
32
18
5
1
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年(8月)