（中国乙06）
麻疹（はしか）発生推移
＝ 2019年04月度 ＝

発表：2020年06月16日衛生健康委

作成：2020年06月17日

日中医療衛生情報研究所

麻疹（はしか）

- 中国の麻疹は、2012年を底に2014年のピーク期を経て減少傾向にある。
- 2010年を除き、毎年4月～5月に発生がピークとなるが、2016年5月は減少を示した。
- 数年毎に突如増えて減少するというパターンを繰り返しているのか、過去に遡ってみようと検討中。

（問題はどこまで遡れるか、、）

- 2009年の値が突出しすぎているので、2019年からは2009年以後の「年度別グラフ」も作成してみた。

乙06: はしか


中国の麻疹（はしか）発症者数（月別）
15,000
13,500
12,000
10,500
9,000
7,500
6,000
4,500
3,000
1,500
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年


中国の麻疹（はしか）死亡者数（月別）
14
12
10
8
6
4
2
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年

乙06: はしか


中国の麻疹（はしか）発症者数（年別）
135,000
120,000
105,000
90,000
75,000
60,000
45,000
30,000
15,000
0
131,441
52,461
38,159
9,943
6,183
27,646
52,628
42,361
24,820
5,941
3,940
2,974
398
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年(4月)


中国の麻疹（はしか）死亡者数（年別）
120
100
80
60
40
20
0
102
39
27
10
8
24
28
32
18
5
1
0
0
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年(4月)

乙06：はしか（2009年以降）