



輸入麻疹症例による国内クラスターの発生

国際的なパンデミックは持続、

流行地から帰国時に疑い症状が現れた場合すぐ病院を受診し渡航歴の積極的申告を！

衛生福利部

www.mohw.gov.tw

2026-03-05

來源： 疾病管制署

疾病管制署（以下疾管署）は本日（3月5日）、「台湾で新たに輸入麻疹症例1例が報告され、国内でクラスターが発生した。初発症例は、中部出身の40代台湾籍男性（症例1）で、彼は今年（2026年）1月下旬から2月上旬にかけ、マレーシアに出張していたが、台湾帰国後7日目に発熱や咳、鼻炎、結膜炎、紅疹などの症状が相次ぎ現れ、発疹の出現後に病院を受診したが、症状が改善せず、病院の救急外来を受診した。病院からの連絡を受け検査をしたところ、2月13日に診断が確定した。症例2は、中部出身の20代女性であるが、医療機関受診中に初発症例と接触していた。接触から18日後に発熱と発疹が出現。自ら衛生単位に連絡した後に、医療機関を受診し報告と検査の後に診断が確定した。このクラスター発生による、確定症例は計2例、初発症例との接触者計58人が確認されているが、症例2を除く残りの接触者に対する経過観察期間は3月4日に終了している；症例2の接触者計87人は3月22日まで監視される予定だ」と発表した。

疾管署は、「今年3月4日までの時点で、台湾では1歳未満から40代までの麻疹患者計4例が報告されているがうち2例が国内感染、残り2例はベトナムとマレーシアからの輸入症例となっている。世界的な麻疹の流行は続いており、マレーシアやベトナム、シンガポール、日本、インドネシア、インド、モンゴル、カザフスタンなどのアジア諸国では、昨年からの症例報告が続いている；米大陸では、今年も多数の国で集団感染が続いており、メキシコや米国、カナダが最多となっている；ヨーロッパでは昨年、30か国で7,000例超の感染例が報告され、ルーマニア、フランス、オランダ、イタリア、スペインでの感染が最多となった。疾管署は、既にベトナム、インドネシア、インド、アンゴラ、メキシコ、イエメン、パキスタン、カザフスタンに対し感染症危険レベル2の「警戒（Alert）」を発令しており、現地では予防措置を強化するよう求める；その他30か国をレベル1の「注意（Watch）」と指定、現地においては一般的な予防措置を遵守するよう」と説明している。

疾管署は「麻疹は非常に感染力が強く、麻疹確定症例との接触がある、或いは地方衛生局から接触者として通知を受けている場合は、「麻疹患者接触者の健康観察通知書」の内容に従い、健康観察と予防措置の徹底をせねばならない。もし、疑わしい症状が現れた場合、マスク着用の上、自らを隔離して速やかに衛生局が手配する医療機関を受診し、軽視をしたり勝手に病院を受診したりしてはならない。さらに、医師にはより一層警戒感を強め、患者の受診時には、TOCC（渡航歴や職業歴、接触歴、クラスターへの参加の有無など）を徹底的に問診し、疑い例の診断と報告を強化するよう強く求める」と注意喚起している。

疾管署は「最近国際的な麻疹流行が続いており、輸入症例およびその後の国内感染リスクが高まっている。台湾国民にあつては、海外旅行の際は個人衛生に注意し、手洗いを励行し、口や鼻に触れないようにし、必要に応じてマスク着用するなど防護措置をとってほしい。1966年以降に生まれた成人で、近い将来に麻疹流行地に旅行する予定がある場合、麻疹に対する免疫があるか否か不明な場合は、感染リスク軽減のために、渡航2~4週間前に渡航医学クリニックに相談し、MMRワクチン接種の必要性を確認するようにしてほしい。妊婦および1歳未満の乳幼児は感染リスクの高いグループであるので、流行地への旅行は避けるべきである；生後6か月から1歳未満の乳児を連れて渡航せねばならない場合、出発前に衛生所或いは渡航医学クリニックに連れて行き、自己負担でMMRワクチン1回接種に関する相談ができる。帰国時に発熱や紅疹、鼻炎、咳、結膜炎などの麻疹が疑われる症状が現れた場合は、直ちに空港の検疫スタッフに通報し、健康評価をうけてほしい。帰国後3週以内に上記症状が現れた場合は、マスク着用の上、すぐに医療機関を受診するとともに、医師に旅行歴や曝露歴を積極的に伝えねばならない。関連情報については、疾管署のグローバル情報ネットワーク (<https://www.cdc.gov.tw>)へのアクセス、或いはフリーダイヤルの流行予防ホットライン 1922（または0800-001922）から入手可能だ」と呼び掛けている。

Taiwan reported a new case of imported measles which led to a domestic cluster. The international pandemic continues; those returning from endemic areas are urged to seek medical attention immediately if there is any suspected symptoms and proactively disclose his/her own travel history.

Ministry of Health and Welfare
Department

www.mohw.gov.tw

2026-03-05

Source: Disease Control

The Taiwan Centers for Disease Control (CDC) announced today (March 5) that one new imported measles case has been reported in Taiwan, leading to a domestic cluster of infections. The index case is a Taiwanese male in his 40s from central Taiwan (Case 1). Case 1 involved a business trip to Malaysia from late January to early February this year (2026). Seven days after returning home, the individual developed symptoms including fever, cough, rhinitis, conjunctivitis, and rash. After the rash appeared, the individual sought medical attention at a clinic. Due to persistent symptoms, the individual went to the hospital emergency room and was confirmed positive on February 13 after testing. Case 2 is a woman in her 20s from central Taiwan. She had contact with the index case while seeking medical treatment. 18 days after contact, she developed fever and rash. After proactively contacting health authorities, she sought medical attention and reported the case, subsequently testing positive. This cluster outbreak has resulted in 2 confirmed cases and 58 contacts of the index case, and except for Case 2, the monitoring period for the remaining contacts ended on March 4; Case's 87 close contacts identified are expected to be monitored until March 22.

CDC stated that as of March 4 this year, Taiwan has recorded a total of 4 measles cases, ranging in age from under 1 year old to over 40 years old. Two of these cases were locally transmitted, while the other two were imported, one from Vietnam and one from Malaysia. The global measles epidemic continues. Asian countries such as Malaysia, Vietnam, Singapore, Japan, Indonesia, India, Mongolia, and Kazakhstan have reported cases since 2025. Several countries in the Americas have also experienced outbreaks this year, with Mexico, the United States, and Canada reporting the most cases. In Europe, 30 countries reported over 7,000 cases last year, with Romania, France, the Netherlands, Italy, and Spain having the most cases. The CDC has issued a Level 2 travel advisory for Vietnam, Indonesia, India, Angola, Mexico, Yemen, Pakistan, and Kazakhstan: Alert, urging the public to take enhanced precautions. The remaining 30 countries are listed as Level 1: Watch, reminding the public to adhere to general preventative measures.

The Taiwan Centers for Disease Control (CDC) reminds the public that measles is highly contagious. If you have had contact with a confirmed case or have been notified by your local health bureau that you have been identified as a contact, please strictly follow the "Measles Case Contact Health Monitoring Notice" and take all necessary health monitoring and protective measures. If you develop any suspected symptoms, wear a mask, self-isolate, and contact the health bureau as soon as possible to arrange for medical treatment. Do not ignore these symptoms or seek medical attention on your own. Physicians are also urged to be vigilant and thoroughly inquire about the TOCC (travel history, occupational history, contact history, and whether you have been in any clusters) when patients seek medical attention, and to strengthen the diagnosis and reporting of suspected cases.

CDC reminds that the recent international measles outbreak continues, increasing the risk of imported cases and subsequent domestic transmission. Taiwanese citizens traveling abroad should pay attention to personal hygiene, wash hands frequently, avoid touching their mouth and nose, and wear masks when appropriate. Adults born in 1966 or later who plan to travel to measles-endemic areas and are unsure of their measles immunity are advised to consult a travel medicine clinic 2-4 weeks prior to departure to assess whether they need MMR vaccination and reduce the risk of infection. Pregnant women and infants under 1 year old are at high risk of infection and should avoid traveling to areas with outbreaks; If you must travel with an infant aged 6 months to under 1 year, you can take the child to a health center or travel medicine clinic before departure to consult about receiving one dose of the MMR vaccine at your own expense. If you develop symptoms resembling measles, such as fever, rash, rhinitis, cough, or conjunctivitis, upon returning home, please promptly inform airport quarantine personnel to cooperate with a health assessment. If you develop any of the above-mentioned suspected symptoms within 3 weeks of returning to your home country, you should wear a mask, seek medical attention as soon as possible, and proactively inform your doctor of your travel and exposure history. Related information can be found on the website of CDC (<https://www.cdc.gov.tw>) or by calling the toll-free epidemic prevention hotline 1922 (or 0800-001922).

..... 以下は中国語原文

國內新增 1 起麻疹境外移入致國內感染群聚事件 國際疫情持續 籲流行區返國民眾有疑似症狀速就醫並主動告知旅遊史

衛生福利部

www.mohw.gov.tw

2026-03-05

來源： 疾病管制署

疾病管制署(下稱疾管署)今(5)日公布國內新增 1 起麻疹境外移入致國內感染群聚事件，指標個案為中部 40 多歲本國籍男性(案 1)，今(2026)年 1 月底至 2 月初曾至馬來西亞洽公，返國 7 天後陸續出現發燒、咳嗽、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，出疹後曾至診所就醫，後續因症狀未改善至醫院急診，經醫院通報採檢於 2 月 13 日確診。另案 2 為中部 20 多歲女性，在指標個案就醫時接觸，於接觸後 18 天出現發燒及出疹，經主動聯繫衛生單位後就醫並通報採檢後確診。本起群聚事件累計確診 2 名，指標個案接觸者共 58 名，除案 2 外，其餘接觸者已於 3 月 4 日監測期滿；案 2 匡列接觸者共 87 名，預計監測至 3 月 22 日。

疾管署說明，我國今年截至 3 月 4 日，累計 4 例麻疹病例，年齡介於未滿 1 歲至 40 多歲，其中 2 例為國內感染病例，另 2 例為境外移入病例，感染國家為越南及馬來西亞各 1 例。全球麻疹疫情持續，亞洲如**馬來西亞**、越南、新加坡、**日本**、印尼、印度、蒙古及哈薩克等國家，自去(2025)年迄今持續有病例發生；美洲今年多個國家亦持續出現疫情，以墨西哥、美國、加拿大報告病例數為多；歐洲去年共計 30 國報告逾 7 千例病例，病例數以羅馬尼亞、法國、荷蘭、義大利及西班牙為多。疾管署已針對**越南**、印尼、印度、安哥拉、墨西哥、葉門、巴基斯坦及哈薩克發布旅遊疫情建議等級第二級：警示(Alert)，請民眾對當地採取加強防護；其他共計 30 國列為第一級：注意(Watch)，提醒民眾遵守當地的一般預防措施。

疾管署提醒，麻疹傳染力非常強，如與確診個案有相關接觸史，或已經地方衛生局通知受匡列為接觸者，請務必遵循「麻疹個案接觸者健康監測通知書」所示，確實做好健康監測及防護措施，如出現疑似症狀，應戴上口罩並自我隔離儘快聯繫衛生局安排就醫，切勿輕忽或自行就醫。另請醫師提高警覺，於病人就醫時，落實詢問 TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、是否群聚)，加強疑似個案診斷與通報。

疾管署呼籲，近期國際麻疹疫情持續，境外移入及造成國內後續傳播風險增加，國人出國旅遊期間應注意個人衛生，勤洗手，避免觸摸口鼻，並適時佩戴口罩等自我防護措施。1966 年(含)以後出生的成人，近期如計劃前往麻疹流行地區，且不確定自己是否具麻疹免疫力，建議出國前 2 至 4 週至旅遊醫學門診諮詢評估是否需接種 MMR 疫苗，以降低感染風險。孕婦及未滿 1 歲嬰幼兒為感染高危險群，應避免前往流行區；如須攜 6 個月以上未滿 1 歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或旅遊醫學門診諮詢自費接種 1 劑 MMR 疫苗。返國時如出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動告知機場檢疫人員配合健康評估。返國 3 週內出現上述疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。相關資訊可至疾管署全球資訊網(<https://www.cdc.gov.tw>)或撥打免付費防疫專線 1922(或 0800-001922)洽詢。

20260305E 輸入麻疹症例による国内クラスターの発生(衛生福利部)